

TRIFAMOX_{IBL}BD[®]

amoxicilina • SULBACTAM



Referências: 1. Referenciando ao estudo do Doutor Marcelo Otsuka pediatra e infectologista. 34. Devitt M. PIDS and IDSA issue management guidelines for community-acquired pneumonia in infants and young children. Am Fam Physician. 2012 Jul 15;86(2):196-202. PMID: 22962933. 42. Chow AW, Benninger MS, Brook I, Brozek JL, Goldstein EJC, Hicks LA et al. IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults. Clinical Infectious Diseases, Volume 54, Issue 8, 15 April 2012, Pages e72–e112, <https://doi.org/10.1093/cid/cis370>

TRIFAMOX IBL BD® (Amoxicilina/Sulbactam) Administração e Apresentações: Trifamox IBL BD® 875/125 embalagem contendo 14 comprimidos revestidos contendo amoxicilina tri-hidratada 875mg sulbactam pivoxilina 125mg. Trifamox IBL BD® 200/50 suspensão: Cada ml da suspensão, após a reconstituição contém amoxicilina tri-hidratada 200mg sulbactam pivoxilina 50mg. Frascos com 15g e 30g de pó para reconstituir 30 ml e 60 ml de suspensão respectivamente, acompanha dosificador. **TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** **Indicações:** Trifamox IBL BD® está indicado para o tratamento dos processos infecciosos causados por micro-organismos sensíveis à amoxicilina e ao sulbactam. **Ação:** Antibiótico bactericida de amplo espectro. **Cuidados e advertências:** Nos tratamentos em longo prazo deve-se avaliar a função hepática e renal do paciente. No caso de insuficiência renal a dose deverá ser ajustada. Pacientes com histórias de alergia e de discrasias sanguíneas devem ser controlados. Avaliar a relação risco-benefício em pacientes com antecedentes de enfermidades gastrointestinais, especialmente colite ulcerosa, enterite regional e colite associada a um antibiótico. Trifamox IBL BD® 200/50 suspensão deve ser conservado em temperatura ambiente antes da reconstituição e protegido de umidade. Após a reconstituição, conservar em geladeira até 14 dias. **Interações medicamentosas:** O uso de amoxicilina e alopurinol aumenta o risco de reações cutâneas do tipo alérgica. A administração de amoxicilina concomitantemente com contraceptivos orais pode diminuir a eficácia, destes últimos. **Reações adversas:** As reações adversas mais frequentes são enjoo, vômitos, diarreia, má digestão e dor no estômago. Como manifestação de disbiose pode produzir candidíase oral ou de outra localização. **Gravidez e lactação:** Não se recomenda a utilização do produto neste período. **Posologia:** **COMPRIMIDOS:** Será adaptada ao critério médico e de acordo com o quadro clínico do paciente. Orientação para adultos e crianças maiores de 12 anos aconselha-se: um comprimido a cada 12 horas. **SUSPENSÃO:** Cada 5 ml da suspensão preparada contém 100mg de amoxicilina e 250mg de sulbactam. A dose deverá ser adaptada, segundo critério médico, ao quadro clínico do paciente. Tomando como base o conteúdo de amoxicilina do produto, a faixa da dose habitual oscila segundo o tipo e a gravidade do processo infeccioso, entre 40 e 100 mg/kg de peso/dia. Trifamox IBL BD® deve ser administrado, no mínimo, durante 2 ou 3 dias adicionais, após a remissão completa do quadro clínico.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA. Reg. MS.1.5626.0020. Fabricado por: LABORATÓRIOS BAGÓ S.A. Importado por: Laboratórios Bagó do Brasil S.A. Rod. ES - 357, KM 66, S/N, Baulinha - Colatina/ES CEP: 29712-022 | CNPJ: 04.748.181/0009-47 Indústria Brasileira.

Referência bibliográfica: 1. Bula do produto

Contra-indicações: Antecedentes de alergia às penicilinas ou às cefalosprinas. Mononucleose infecciosa.

Interações medicamentosas: O uso concomitante de penicilinas e metotrexato necessita de cuidados.

Mais informações em nosso Serviço de Atendimento ao Cliente

Whatsapp:(SAC)800-2826569 - (SAC)0800-2826569 www.bago.com.br

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA A CLASSE MÉDICA.

TRIFAMOX_{IBL}BD[®]

amoxicilina • SULBACTAM



ATUALIZAÇÕES SOBRE INFECÇÕES DO TRATO RESPIRATÓRIO

DR. MARCELO OTSUKA

Bagó

Bagó

DESTAQUES DO MATERIAL

EM TRATAMENTO EMPÍRICO DOMICILIAR DAS INFECÇÕES DE VIAS AÉREAS COM PNEUMONIA ADQUIRIDAS NA COMUNIDADE (PAC), SEM COMORBIDADES E SEM USO PRÉVIO DE ANTIMICROBIANOS, TEM COMO PRIMEIRA LINHA AS AMINOPENICILINAS (MELHOR INDICADA A AMOXICILINA) ISOLADAMENTE OU EM ASSOCIAÇÃO COM INIBIDOR DE BETALACTAMASE. ⁽³⁴⁾

GANHA-SE DESTAQUE NO USO DA ASSOCIAÇÃO COM INIBIDOR DE BETALACTAMASE EM CASOS DE H. INFLUENZAE E MORAXELLA CATARRHALIS EM INFECÇÕES DAS VIAS AÉRAS SUPERIORES E INFERIORES. ⁽⁴²⁾

TRATAMENTO DAS
INFECÇÕES DE VIAS
AÉREAS SUPERIORES
E INFERIORES ⁽¹⁾

QUANDO NECESSÁRIO
O USO DE INIBIDOR
DE BETALACTAMASE ⁽¹⁾

AMOXICILINA
+
SULBACTAM

PARA TER ACESSO AO ESTUDO
COMPLETO ESCANEIE O QR CODE

